

研究・調査報告書

分類番号	報告書番号	担当
A-169	13-126	滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門
題名 (原題/訳)		
Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. 精神疾患や薬物使用による障害が及ぼす世界的負担 : Global Burden of Disease Study 2010 より		
執筆者		
Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, Baxter AJ, Ferrari AJ, Erskine HE, Charlson FJ, Norman RE, Flaxman AD, Johns N, Burstein R, Murray CJ, Vos T.		
掲載誌		
Lancet. 2013 Nov 9;382(9904):1575-86. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61611-6.		
キーワード		PMID
精神疾患、薬物使用による障害、疾病による負担		23993280
要 旨		
<p>背景： 精神疾患および薬物使用による障害に起因する世界的負担について、Global Burden of Disease Study 2010 のデータを用いて、障害期間調整生存年数(DALYs)、若年死による余命損失年数(YLLs)、障害を伴って生存した年数(YLDs)の観点から調査した。</p> <p>方法： 精神疾患、薬物使用による障害のそれぞれ 20 件について、ベイジアンメタ回帰(DisMod-MR)によって解析した。地域調査およびインターネット調査から障害の重さを調べ、YLDs を求めた。1980 から 2010 年の間の 20 歳ごとの年齢、男性・女性、187 カ国のデータから YLLs を算出した。DALYs は YLDs と YLLs の合計として算出した。</p> <p>結果： 精神疾患および薬物使用障害は 183,900,000DALYs と算出され、これは世界の全 DALYs の 7.4%であった。YLLs では 8,600,000 (全 YLLs の 0.5%) であり、175,300,000YLDs (全 YLDs の 22.9%) に相当した。精神障害および薬物使用障害は世界の YLDs のもっとも大きな原因であった。抑鬱障害は、精神障害および薬物使用障害による DALYs の 40.5%であり、同様に不安障害は 14.6%、以下違法薬物による障害、アルコールによる障害などが続いた。精神障害および薬物使用障害による世界的負担は 1990～2010 年の間に 37.6%増加していた。</p> <p>結論： 精神障害や薬物使用による障害は先進国、途上国ともに医療上の課題であり、これらの予防や治療を公衆衛生の優先事項と定めて初めて公衆衛生の改善が可能になるだろう。</p>		