

研究・調査報告書

分類番号	報告書番号	担当
A-152	22-034	滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門 三浦克之
題名 (原題/訳)		
Gender-related associations between psychiatric disorders and alcohol use disorder: Findings from the french "Mental health in the general population" survey アルコール使用障害(AUD)と他の精神障害との関連の性差		
執筆者		
Lespine LF, Bramness JG, Pignon B, Vaiva G, Thomas P, Roelandt JL, Benradia I, Amad A, Geoffroy PA, Rolland B.		
掲載誌		
Arch Womens Ment Health. 2022 Oct;25(5):895-902. doi: 10.1007/s00737-022-01253-5. Epub 2022 Sep 9.		
キーワード		PMID
性差、アルコール使用障害、精神障害		36083520
要 旨		
<p>目的: アルコール使用障害(AUD)と他の精神障害の関連を性別に検討する。</p> <p>方法: フランス人 38,717 人を対象に面談を行った。Mini International Neuropsychiatric Interview を用いて AUD 等の精神障害の有無を評価した。ロジスティックモデルを用いて AUD と他の精神障害の合併するオッズ比(OR)と 95%信頼区間を算出した。</p> <p>結果: 男女ともにAUDはうつ病(女性2.6(2.0-3.4),男性2.0(1.7-2.4))、双極性障害(女性2.5(1.4-4.4),男性2.6(1.9-3.4))の併存リスクが高く、女性は統合失調症(女性1.6(1.01-2.5),男性1.8(1.4-2.3))の併存リスクが高かった。また、女性はパニック障害と女性は PTSD の併存リスクが高かった。薬物使用の併存リスクは男性より女性で高かった(女性 12.9(8.1-18.1),男性 4.8(4.0-5.8))。</p> <p>結論: AUD は男女ともに多くの精神障害を併存するリスクが高かったが、女性は薬物使用、パニック障害、男性は PTSD を併存するリスクが高かった。</p>		